

R7/4/15

癌化学療法レジメン登録用紙

レジメン名	Her+G-SOX	催吐リスク 中等度
対象疾患	進行・再発胃癌(Her2発現)	
令和3年12月28日 L-OHPが130mg/m ² のレジメンを追加		
令和6年8月16日 アロカリスを追加、DEX4.95mgに変更		

a) 投与薬剤名と投与量、投与方法

初回	薬剤名	量	投与方法
day1	① パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL + デカドロン4.95mg + アロカリス235mg	30分で点滴	
	② 生食250mL + 注射用水40mL◎ + ハーセプチニ8mg/kg	90分以上で点滴	
	③ 5%ブドウ糖500mL + エルプラット100mg/m ² ※※	120分で点滴	
	④ テルモ生食100ml	15分で点滴	


2回目以降

day1	① パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL + デカドロン4.95mg + アロカリス235mg	30分で点滴
	② 生食250mL + 注射用水40mL◎ + ハーセプチニ6mg/kg	90分以上で点滴●
	③ 5%ブドウ糖500mL + エルプラット100mg/m ² ※※	120分で点滴
	④ テルモ生食100ml	15分で点滴

- 初回の容忍性が良好なら、2回目以降は30分投与可。
- ◎ 60mgバイアル1Vあたり注射用水3.0mLで溶解
150mgバイアル1Vあたり注射用水7.2mLで溶解

TS-1	内服
day1～day14	
TS-1	BSA<1.25m ² 80mg/day を分2で内服
※	1.25≤BSA<1.5m ² 100mg/day を分2で内服
	1.5m ² ≤BSA 120mg/day を分2で内服

b) 投与スケジュール

※※ G-SOX(130)はエルプラット130mg/m²