

## 癌化学療法レジメン登録用紙

レジメン名  
対象疾患  
診療科

## Bev+IRIS(FIRIS study)

## 大腸癌

## 外科

催吐リスク  
中等度


a) 投与薬剤名と投与量、投与方法

日付	薬剤名	量	投与方法
day1～day14	TS-1cap	※	内服
day1,15			
①	生食100mL+ベバシズマブBS 5mg/kg	90分で点滴※※	
②	パロノセトロンバッグ0.75mg/50mL+デカドロン4.95mg	30分で点滴	
③	5%TZ250mL+イリノテカン125mg/m <sup>2</sup>	90分で点滴	
④	生食100mL	15分で点滴	
※	TS-1 BSA<1.25m <sup>2</sup>	80mg/day を分2で内服	
	1.25≤BSA≤1.5m <sup>2</sup>	100mg/day を分2で内服	
	BSA>1.5m <sup>2</sup>	120mg/day を分2で内服	

※※ 初回が良好なら2回目からは60分で投与可能。  
2回目が良好なら3回目以降からは30分で投与可能。

b) 投与スケジュール

1コース28日



注)【S】Bev+IRIS(FIRIS study)の方で入力するとCPT-11,Bev1回分のみ入力されるので要注意。