

R7/4/15

癌化学療法レジメン登録用紙

レジメン名
対象疾患
診療科

mFOLFOXIRI

大腸癌

外科

| |
|-------|
| 催吐リスク |
| 高度 |

a) 投与薬剤名と投与量、投与方法

※最大12コースまで。13コース以降は5-FU/I-LV維持療法。

| | 薬剤名 | 量 | 投与方法 |
|------|--|------------------|--------|
| day1 | ① 生食50mL(持続注入ポンプ使用時) | | ルート確保用 |
| | ② パロノセトロンバッグ0.75mg/50mL+デカドロン9.9mg | 30分で点滴 | |
| | ③ 5%ブドウ糖250mL+イリノテカン150mg/m ² | 60分で点滴 | |
| | ④-1 5%ブドウ糖250mL+エルプラット85mg/m ² | 120分で点滴 | |
| | ④-2 5%ブドウ糖250mL+レボホリナート200mg/m ² | 120分で点滴 | |
| | ⑤ 生食500mL+5-FU2400mg/m ² | 46時間で点滴 | |
| もしくは | 生食(total140mLになるように)+5-FU2400mg/m ² | 46時間で持続注入ポンプにて投与 | |
| | ⑥ 生食100mL(持続注入ポンプを使用しない時) | 15分で点滴 | |

5-FU/I-LV維持療法(13コース以降)

| | 薬剤名 | 量 | 投与方法 |
|------|--|------------------|--------|
| day1 | ① 生食50mL(持続注入ポンプ使用時) | | ルート確保用 |
| | ② 生食100mL+デカドロン6.6mg | 30分で点滴 | |
| | ③ 5%ブドウ糖250mL+レボホリナート200mg/m ² | 120分で点滴 | |
| | ④ 生食500mL+5-FU2400mg/m ² | 46時間で点滴 | |
| もしくは | 生食(total140mLになるように)+5-FU2400mg/m ² | 46時間で持続注入ポンプにて投与 | |
| | ⑤ 生食100mL(持続注入ポンプを使用しない時) | 15分で点滴 | |

b) 投与スケジュール

1コース14日

